ВАКЦИНА ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ДЛЯ ЩАДЯЩЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ИММУНИЗАЦИИ (БЦЖ-М)

Производитель: ФГБУ «НИЦЭМ им.Гамалеи», г.Москва, ул.Гамалей,18.

Осложнения: отмечаются редко и обычно носят местный характер.

Крайне редко - встречается БЦЖ – инфекция без летального исхода (волчанка, оститы).

Чрезвычайно редко–генерализованное поражение БЦЖ при врожденном иммунодефиците.

ОСЛОЖНЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ – ОТ НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ ДО ГОДА И более…

Поствакцинальный период: через 4-6недель после введения последовательно развивается местная специфическая реакция в виде инфильтрата, папулы, пустулы, язвы диаметром 5-10мм. в диаметре.

Возможные последствия отказа: заражение ребенка туберкулезом.

Годен до: 04.2020г.



ВАКЦИНА ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ (БЦЖ)

Производитель: ФГБУ «НИЦЭМ им.Гамалеи», г.Москва, ул.Гамалей,18.

Осложнения: отмечаются редко и обычно носят местный характер.

Крайне редко - встречается БЦЖ – инфекция без летального исхода (волчанка, оститы).

Чрезвычайно редко–генерализованное поражение БЦЖ при врожденном иммунодефиците.

ОСЛОЖНЕНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ – ОТ НЕСКОЛЬКИХ НЕДЕЛЬ ДО ГОДА И более…

Поствакцинальный период: через 4-6недель после введения последовательно развивается местная специфическая реакция в виде инфильтрата, папулы, пустулы, язвы диаметром 5-10мм.в диаметре.

Возможные последствия отказа: заражение ребенка туберкулезом.

Противопоказания: - Недоношенность – масса тела при рождении менее 2500кг.

- Внутриутробная гипотрофия III – IV – степени.
- Острые заболевания.
- Иммунодефицитное состояние, злокачественные новообразования.
- Генерализованная инфекция БЦЖ, выявленная у других детей в семье.
- ВИЧ – инфекция у матери новорожденного.

Годен до: 02.2020г.

ДЕТИ, ИМЕЮЩИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАЦИНАЦИИ БЦЖ, ПРИВИВАЮТСЯ ВАКЦИНОЙ БЦЖ – М С СОБЛЮДЕНИЕМ ИНСТРУКЦИИ К ЭТОЙ ВАКЦИНЕ.



ВАКЦИНА ПРОТИВ ГЕПАТИТА «В», РЕКОМБИНАНТНАЯ ДРОЖЖЕВАЯ ЖИДКАЯ (РЕГЕВАК В)

Производитель: АО «Биннофарм», г.Москва, г.Зеленград, ул. Конструктора Гуськова, д.3, строение 1.

Назначение: Профилактика гепатита В у детей в рамках национального календаря профилактических прививок.

Способ введения: внутримышечно, новорожденным и детям младшего возраста в верхненаружную поверхность средней части бедра.

Побочное действие: повышение температуры, недомогание, слабость, боль в суставах, мышцах, головная боль, головокружение, тошнота, рвота.

Возможные последствия отказа: заражение ребенка гепатитом «В».

Годен до: 10.2020г.

ВСЕ РЕАКЦИИ НА ВВЕДЕНИЕ СЛАБЫЕ, ОБЫЧНО ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ИСПОЛЬЗУЮТ ВАКЦИНУ БЕЗ КОНСЕРВАНТА!!!

ВАКЦИНА ПНЕВМОКОККОВАЯ ПОЛИСАХАРИДНАЯ КОНЪЮГИРОВАННАЯ АДСОРБИРОВАННАЯ, ТРИНАДЦАТИВАЛЕНТНАЯ (ПРЕВЕНАР 13)

Производитель: ООО «НПО Петровакс Фарм», РФ, Московская область, Подольский район, с.Покров, ул.Сосновая, д.1.

Назначение: профилактика пневмококковой инфекции (менингиты, бактериемии, сепсис, тяжелые пневмонии, отиты.

Способ введения: внутримышечно. Детям 1-ого и 2-ого года жизни в верхнее - наружную поверхность средней трети бедра, детям старше 2-х лет – в дельтовидную мышцу плеча.

Побочное действие: повышение температуры, раздражительность, снижение аппетита, нарушение ритма сна.

Возможные последствия отказа: тяжелые формы пневмоний, отитов, менингитов.

Годен до: 02.2021г.



ВАКЦИНА ПРОТИВ КРАСНУХИ КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ЖИВАЯ **Производитель:** ОА «НПО «Микроген»», Р.Ф., г.Москва, ул. Дубровская 1-я, двлд.15. **Назначение:** Профилактика краснухи. **Способ введения:** подкожно в область плеча. **Побочное действие:** кожная сыпь, увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов, гиперемия на месте инъекции, отек, уплотнение, болезненность. На 6-14 день может быть повышение температуры, конъюнктивит. **Возможные последствия отказа:** заболевание краснухой. **Годен до:** 12.2020г.	
ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕФТИРИИ И СТОЛБНЯКА АДСОРМИРОВАННАЯ, КОКЛЮША АЦЕЛЛЮЛЯРНАЯ, ПОЛИОМИЕЛИТА ИНАКТИВИРОВАННАЯ И ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ *Haemophilus influenza тип b* КОНЪЮГИРОВАННАЯ (ПЕНТАКСИМ) **Производитель:** Санофи Пастер С.А., Франция. **Назначение:** Первичная вакцинация и ревакцинация детей против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и инфекции вызываемой Haemophilus influenza тип b (менингит, септицемия, артрит, эпиглоттит, пневмония, остеомиелит). **Способ введения:** внутримышечно детям от 3 до 24 мес. – средняя треть переднелатеральной поверхности бедра, детям старше 24 мес. – в дельтовидную мышцу плеча. **Побочное действие:** раздражительность, реакция в месте инъекции (покраснение, уплотнение). **Возможные последствия отказа:** заболевание дифтерией, столбняком, коклюшем, полиомиелитом, гемофильной инфекцией. **Годен до:** 05.2020г.	

ВАКЦИНА ПАРОТИТНО-КОРЕВАЯ КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ЖИВАЯ **Производитель:** АО «НПО «Микроген», РФ., г.Москва, ул. Дубровская 1-я, двлд.15. **Назначение:** Профилактика кори и эпидемического паротита. **Способ введения:** подкожно под лопатку или в область плеча. **Побочное действие:** повышение температуры, ринит. **Возможные последствия отказа:** заболевание корью, паротитом. **Годен до:** 12.2019г.	
ВАКЦИНА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕННАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ИНАКТИВИРОВАННАЯ СУХАЯ **Производитель:** ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.М.П.Чумакова РАН», Р.Ф., г.Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корп.1. **Назначение:** Специфическая профилактика клещевого энцефалита у детей с 3-х лет и взрослых.. **Способ введения:** внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча. **Побочное действие:** покраснение, болезненность в месте введения, головная боль, повышение температуры. **Возможные последствия отказа:** тяжелые формы энцефалита. **Годен до:** 05.2022г.	
ВАКЦИНА КОКЛЮШНО – ДИФТЕРИЙНО – СТОЛБНЯЧНАЯ АДСОРБИРОВАННАЯ (АКДС – вакцина) **Производитель:** АО «НПО «Микроген», РФ., г.Москва, ул. Дубровская 1-я, двлд.15. **Назначение:** Профилактика коклюша, дифтерии и столбняка у детей. **Способ введения:** внутримышечно в передненаружную область бедра. **Побочное действие:** в первые 2-е суток - повышение температуры, недомогание, местные – болезненность, гиперемия, отечность. **Возможные последствия отказа:** заболевание коклюшем, дифтерией, столбняком. **Годен до:** 01.2020г.	

ВАКЦИНА ПРОТИВ КОКЛЮША, ДИФТЕРИИ, СТОЛБНЯКА И ГЕПАТИТА «В» АДСОРБИРОВАННАЯ. **Производитель:** АО «НПО «Микроген», РФ., г.Москва, ул. Дубровская 1-я, двлд.15. **Назначение:** Профилактика коклюша, дифтерии и столбняка и гепатита «В» у детей. **Способ введения:** внутримышечно в передненаружную область бедра. **Побочное действие:** в первые 2-е суток - повышение температуры, недомогание, местные – болезненность, гиперемия, отечность. **Возможные последствия отказа:** заболевание коклюшем, дифтерией, столбняком, гепатитом «В». **Годен до:** 06.2020г.	
ВАКЦИНА ПОЛИОМИЕЛИТНАЯ ПЕРОРАЛЬНАЯ, ДВУХВАЛЕНТНАЯ, ЖИВАЯ АТТЕНУИРОВАННАЯ 1,3 ТИПОВ (БиВак полио) **Производитель:** ФГБНУ «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.М.П.Чумакова РАН», Р.Ф., г.Москва, поселение Московский, поселок Института полиомиелита, дом 8, корп.1. **Назначение:** Активная профилактика полиомиелита. **Способ введения:** вакцина предназначена только для перорального применения. **Побочное действие:** повышение температуры, рвота, головная боль. **Возможные последствия отказа:** заболевание полиомиелитом. **Годен до:** 01.2020г.	
ВАКЦИНА ГЕМОФИЛЬНАЯ ТИП b КОНЪЮГИРОВАННАЯ **Производитель:** ФБУН РостовНИИ микробиологии и паразитологии РФ., г.Ростов – на – Дону, пер.Газетный, 119. **Назначение:** профилактика гнойно – септических заболеваний вызываемых Haemophilus influenza тип b. **Способ введения:** внутримышечно в верхненаружную поверхность средней части бедра. **Побочное действие:** в первые 48 часов болезненность в месте введения, гиперемия, отечность, повышение температуры, снижение аппетита, беспокойство. **Возможные последствия отказа:** тяжелые формы гнойно – септических заболеваний. **Годен до:** 10.2020г.	

АЛЛЕРГЕН ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ РЕКОМБИНАНТНЫЙ В СТАНДАРТНОМ РАЗВЕДЕНИИ, РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЕЯ (Диаскинтест) **Производитель:** АО «ГЕНЕРИУМ», РФ., Владимирская обл., Петушинский р-он., пос.Вольгинский, корпус 17. **Назначение:** предназначен для постановки внутрикожной ПРОБЫ с целью массовой диагностики туберкулезной инфекции. **Способ введения:** внутрикожно. **Побочное действие:** недомогание, головная боль, повышение температуры тела. **Возможные последствия отказа:** отсутствие ранней диагностики туберкулеза. **Годен до:** 04.2020г.	
БИОЛЕК Тубекркулин ППД – Л **Производитель:** АО «Фармстандарт», РФ., Московская обл., г.Долгопрудный, Лихачевский проезд, д.5 «Б». **Назначение:** предназначен для постановки внутрикожной ПРОБЫ с целью массовой диагностики туберкулезной инфекции. **Способ введения:** внутрикожно. **Побочное действие:** недомогание, головная боль, повышение температуры тела. **Возможные последствия отказа:** отсутствие ранней диагностики туберкулеза. **Годен до:** 03.2021г.	